

林地用除草剤

ホドガヤ

サイトロン^{*}

アミン
液剤

クズなど広葉雑草を選択的に防除！
ニセアカシアを枯死させる!!

特長

- ① 莖葉より吸収されて成長の盛んな部位へ移行するので、植物を枯死させる事が出来ます。
- ② クズやつる類・ニセアカシアなどの落葉雑草かん木の防除に有効です。
- ③ 下刈り効果が翌年まで期待できます。



有効成分：トリクロピルトリエチルアンモニウム……44%

適用雑草と使用方法

※本剤及びトリクロピルを含む農薬の総使用回数

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期	使用薬量または 希釈倍数	散布液量	総使用 回数※	使用方法
すぎ ひのき (下刈り)	クズ、落葉雑かん木 一年生及び 多年生広葉雑草	雑草木の 新葉展開後 ～生育期	350ml/10a	30ℓ/10a	2回 以内	雑草木 茎葉散布
造林地	雑かん木	4月～10月	10～15倍	45ml/株径15cm		切株処理
	クズ		25倍	10～20ml/株径3～5cm		株頭処理
	クズ フジ等つる頭	11月～5月	3倍	1ml/株		つる切処理
		4月～10月	2～3倍	0.5～2ml/株径2～5cm		切株処理
ニセアカシア	3月～9月	20倍	10～20ml/株径10cm	立木処理		
		3倍	3ml/樹形8～9cm			


効果的な使用方法

●杉、ヒノキの下刈りの全面散布

雑草やクズの草丈が1.5m以上のものに対しては効果が劣ります。1.5m以下の時期に使用すると効果が増します。

●クズの株頭処理

クズの株頭に近いところで立ち上がっているツルとランナーを切断し、株の最大径まで掘り起こし、露出した株頭全面が濡れる程度に散布してください。



●広葉樹の切株処理(ニセアカシアの切り株処理も同様)

- 古い切り株(伐倒後半年以上たったもの)は、薬液が樹皮内によく浸透するようナタ目を入れ、その部分に十分散布してください。
- 萌芽部にも散布してください。
- 地上部に露出した全部分に散布してください。*樹液が移動を始める春期に処理すると十分な効果が得られます。

●ニセアカシアの立木処理

幹に切れ目なく切り傷をつけ、その部分に薬液が十分付着するように処理してください。

●クズ、フジ等のつる切処理

2～3か所にナタ等でツルに傷をつけてから、切口に薬液が十分付着するように処理してください。

⚠ 使用上の注意事項  

- 金属腐食性があるので、散布器具や薬液の調整に使用した容器等は使用後直ちに水で十分洗ってください。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調整時および立木、切り株等の処理の際には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗い、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する際には小児や散布に関係のないものが作業現場に近づかないように配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。また散布後であっても、少なくともその当日は散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮してください。
- 使用残りの薬液は必ず安全な場所に保管してください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。 ★ラベルの記載以外には使用しないでください。 ★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売：

製造：
本社：**保土谷アグロテック株式会社**

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目4番1号
TEL 03-5299-8225 FAX 03-5299-8285

2013.3.ZAAM001.ALVO